

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

КОККУЛИН®

Регистрационный номер

Торговое наименование

Коккулин®

Лекарственная форма

Таблетки гомеопатические

Состав (на 1 таблетку)

Активные компоненты:

Cocculus indicus (коккулюс индикус)	C4	0,375 мг
Nux vomica (нукс вомика)	C4	0,375 мг
Tabacum (табакум)	C4	0,375 мг
Petroleum (петролеум)	C4	0,375 мг

Вспомогательные вещества:

сахароза, лактоза, магния стеарат до 150мг

Описание

Таблетки цилиндрические двояковыпуклой формы, белого цвета, без запаха или со слабым запахом

Фармакотерапевтическая группа

Гомеопатическое средство

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Многокомпонентный гомеопатический препарат, действие которого обусловлено компонентами, входящими в его состав

Фармакокинетика

Не применимо

Показания к применению

Препарат показан к применению у взрослых и детей в возрасте от 3 лет до 18 лет при укачивании в транспорте (профилактика и лечение)

Противопоказания

Дефицит сахаразы/изомальтазы и лактазы, непереносимость лактозы и фруктозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция. Возраст до 3 лет (в связи с недостаточностью клинических данных).

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Препарат применяется по назначению врача

Способ применения и дозы

В профилактических целях рассасывать по 2 таблетки 3 раза в день накануне и в день поездки.

В лечебных целях рассасывать по 2 таблетки каждый час до улучшения состояния, но не более 6 таблеток в день.

Детям от 3 лет до 6 лет перед приемом таблетку следует растворить в небольшом количестве воды (например, в 1 столовой ложке).

Побочное действие

Возможны аллергические реакции. При появлении побочных эффектов следует обратиться к врачу.

Передозировка

Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами

На настоящий момент данные о взаимодействии с другими лекарственными средствами отсутствуют. Прием препарата не исключает лечение другими лекарственными средствами.

Особые указания

При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно обостриться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае следует прекратить прием препарата и обратиться к врачу. Если после нескольких дней лечения улучшение не наступает или появляются побочные эффекты, следует проконсультироваться с врачом.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Применение препарата не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами).

Форма выпуска

Таблетки гомеопатические. По 10 таблеток в блистер из пленки ПВХ и лакированной алюминиевой фольги. По 3 блистера (по 10 таблеток) вместе с инструкцией по применению помещают в картонную пачку с заклеивающимся по бокам «язычком».

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25°С
Хранить в недоступном для детей месте

Срок годности

5 лет
Не применять по истечении срока годности

Условия отпуска

Отпускают без рецепта

Производитель

БУАРОН, 2, авеню де л`Уэст Лионнэ,
69510 Мессими, Франция

Место производства

2, авеню де л`Уэст Лионнэ, 69510 Мессими, Франция

Представитель в России/ организация, принимающая претензии потребителей

ООО «Буарон», Москва, ул. Долгоруковская, д. 7
Тел. (495) 956 08 10, факс (495) 956 08 14